

Ankieta ryzyka zakażenia WZW typu B

Czy znajdujesz się w grupie podwyższonego ryzyka przewlekłego WZW typu B?

Nazwisko: _____ Data: _____

W przypadku stwierdzenia podwyższonej aktywności (AIAT)* lub twierdzącej odpowiedzi na którekolwiek z poniższych pytań, powinieneś wykonać szczegółowe testy na obecność we krwi:

- HBsAg (antygen powierzchniowy)
- Anty-HBc (przeciwciała przeciw antygenowi rdzeniowemu)

Zaznacz prawdziwe dla siebie twierdzenia i zabierz wypełniona ankietę na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu

- Często zmieniasz partnerów seksualnych
- Jesteś imigranem z regionu o wysokiej częstości występowania zakażenia wirusem WZW typu B
- Członek Twojej rodziny, współlokator lub partner seksualny jest zakażony wirusem WZW typu B
- Jesteś mężczyzną mającym kontakty seksualne z innymi mężczyznami.
- Należysz do grupy zawodowej o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem WZW typu B (pracownikiem służby zdrowia lub służby więziennej)
- Twoje wyniki badań wątroby odbiegają od normy lub masz kliniczne objawy wirusowego zapalenia wątroby
- Masz marskość / zwłóknienie wątroby
- Masz raka wątrobowokomórkowego
- Jesteś zakażony wirusem WZW typu C lub/i HIV
- Stosujesz obecnie lub kiedykolwiek stosowałeś narkotyki drogą dożylną
- Jesteś obecnie dializowany
- Przeszedłeś transplantację narządu
- Jesteś dawcą krwi lub narządów
- Przeszedłeś transfuzję krwi przed 1991 rokiem
- Byłeś lub jesteś obecnie poddany leczeniu immunosupresyjnemu lub chemioterapii
- Przebywałeś w ośrodku psychiatrycznym
- Przebywałeś w ośrodku opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi lub ośrodku poprawczym
- Jesteś w ciąży (tylko badanie obecności antygenu HBs)
- Masz nowonarodzone dziecko i wcześniej stwierdzono u Ciebie obecność antygenu HBs (HBsAg) i /lub przeciwciał przeciwko antygenowi HBc (Anty-HBc)

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B powinno być prowadzone przez doświadczonego lekarza specjalistę. Skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym, by określić ryzyko zakażenia.

* AIAT = aminotransferaza alaninowa; Norma: <40 IU / L

** S3 wytyczne podane za Cornberg M, i inni.: Zapobieganie, diagnostyka i leczenie zakażeń HBV. Aktualizacja wytycznych . Aktualizacja wytycznych , Z, Gastroenterol 2007; 45:1-50